

Pathologies avec éviction scolaire

Guide des maladies infectieuses en collectivités - HCSP

Affections (MDO)	Temps d'éviction	Mesures à prendre en collectivité	Mode de contamination	Contagiosité
Gale	Jusqu'à 3 jours après un traitement local	Traitement simultané de tous les patients et de l'environnement Gale profuse, cas récidivants dans des collectivités fermées (difficultés à interrompre la chaîne de transmission) = discuter l'opportunité d'un traitement environnemental	P + E	Moyenne
Scarlatine	Jusqu'à 2 jours après le début de l'antibiothérapie.	Application stricte des mesures d'hygiène Application stricte des mesures d'hygiène des mains	P	Moyenne
Tuberculose	si la personne est bacillifère Durée : au minimum 1 mois d'arrêt après le début du traitement et un examen microscopique négatif avant la reprise En cas de contact avec des populations à risque, exiger une culture négative.	Pas de mesure particulière	P	Moyenne
Hépatite E	Durée : 10 jours à compter du début de l'ictère ou des signes cliniques	Application stricte des mesures d'hygiène Application stricte des mesures d'hygiène des mains	P + E	Faible
Infection Invasive à Méningocoque	Hospitalisation du sujet index	Pas de mesures d'hygiène spécifiques Traitement des cas contacts	P	Faible